

Indicadores sanitarios para transición a la 1^{ra} etapa de la recuperación.

Tasa de incidencia: Número de casos nuevos, dividido por el número de la población expuesta o en riesgo de contraer la enfermedad, en un lugar y un período específico.

Índice reproductivo: Número promedio de casos nuevos de la enfermedad causados por un individuo infectado, en el transcurso del período infeccioso o de contagio. Proporciona una medida de la velocidad y severidad de la propagación de un patógeno.

* **Ro:** número reproductivo básico.

- ✓ Fase 1: Ro hasta 1
- ✓ Fase 2: Ro por debajo de 1
- ✓ Fase 3: Ro por debajo de 0.95

Casos activos: Son aquellos pacientes diagnosticados que se mantienen ingresados. Siempre se evaluaría la dispersión de los casos en cada uno de los territorios.

Fase 1: 5 % o menos
Fase 2: 3 % o menos
Fase 3: 1 % o menos

Número de casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 días: Es el porcentaje de casos confirmados en los que se identifica una fuente de infección, por contacto con casos confirmados o estadía en países con transmisión de la enfermedad. Permite identificar la calidad del estudio epidemiológico realizado y la transmisión de la enfermedad.

Fase 1: 90 %

Fase 2: 95 %

Fase 3: 98 %

Eventos de transmisión local: Número de eventos abiertos.