

TOXOPLASMOSIS EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS

Autor (es):

Dra. Ekaterines Zayas Tamayo¹
 Dra. Karelia Columbie González²
 Lic. Ivett Mesa Castellanos³
 Lic. Cesar Poutu Sanchez⁴
 Lic. Adeline Pérez Infante⁵

Toxoplasmosis

Toxoplasmosis

¹Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología, Santiago de Cuba, Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba, Cuba, ekaterine@infomed.sld.cu <https://orcid.org/0000-0003-2797-2849>

²Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Laboratorio Provincial de Microbiología. Santiago de Cuba, Cuba, kareolombie03@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-5590-8410>

³Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Laboratorio Provincial de Microbiología. Santiago de Cuba, ivettmesa67@gmail.com

⁴Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Laboratorio Provincial de Microbiología. Cuba, ekaterinet@infomed.sld.cu, <https://orcid.org/0009-0002-7860-7673>

⁵Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Santiago de Cuba, Laboratorio Provincial de Microbiología Cuba, cesarpoutou@nauta.com.cu, <https://orcid.org/0009-0005-4601-0049>

INTRODUCCION (OBJETIVOS)

La toxoplasmosis representa una de las infecciones oportunistas más relevantes, en pacientes inmunodeprimidos. El parásito *Toxoplasma gondii* se adquiere a través de la ingestión de ooquistes presentes en el ambiente, suelo, agua, verduras contaminadas con heces de gatos, o por consumo de carnes mal cocidas que contengan quistes tisulares. **Objetivo:** Determinar la incidencia de Toxoplasmosis en pacientes con afecciones clínicas

METODOLOGÍA

Tipo de estudio: observacional descriptivo, transversal

Población: estuvo constituida por 264 sueros de pacientes, procedentes de todos los municipios de la provincia, procesados mediante la técnica Toxoplasma Látex.

Se aplicó un cuestionario para identificar factores de riesgo.

RESULTADOS Y DISCUSION

Tabla 1. Pacientes según diagnóstico clínico

Diagnóstico Clínico	Nro de Pacientes	%
Retrovirus Crónica	34	66,6
Uveítis	3	5,8
Coriorretinitis	4	7,8
Ataxia	1	1,9
Síndrome Febril Prolongado	9	17,6
Total	51	100

Gráfico 1. Muestras procesadas según sexo.



CONCLUSIONES

La identificación temprana y el manejo adecuado de la toxoplasmosis son cruciales para reducir las complicaciones asociadas, constituyendo un desafío para la salud pública con un predominio significativo entre los adultos jóvenes, con sistemas inmunitarios inmunocomprometidos