

## Introducción




## Objetivos



Identificar la relación entre marcadores de la respuesta inmune humoral con el diagnóstico de espondiloartropatía en pacientes con uveítis anterior no infecciosa

## Materiales y Métodos



## Resultados

Alteraciones de las inmunoglobulinas y proteínas del complemento en pacientes con UANI	Espondiloartropatías	OR	IC (95 %)	p
<b>Alteraciones de las proteínas del complemento</b>				
Disminución C3 n (%)	4 (6,45)	4,82	1,35-17,11	<b>0,0328*</b>
Aumento C3 n (%)	25 (40,3)	5,21	1,32-15,4	0,1412
Disminución C4 n (%)	3 (4,8)	9,09	2,13-38,88	<b>0,0074*</b>
Aumento C4 n (%)	11 (17,8)	3,42	1,21-12,3	0,1111

## Conclusiones

❖ Las alteraciones de la respuesta inmune humoral se asociaron al diagnóstico de espondiloartropatía.

## Aporte Económico y Social

❖ La identificación y tratamiento de estos factores asociados al diagnóstico de espondiloartropatía permite instaurar terapéuticas más específicas y oportunas para evitar complicaciones severas y así minimizar los gastos a los sistemas de salud por las complicaciones.

