

La FDA advierte sobre el riesgo de problemas cardíacos por el uso no adecuado de loperamida.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que consumir dosis superiores a las recomendadas, por abuso o mal uso del medicamento loperamida, puede causar graves problemas del corazón que pueden incluso conllevar a la muerte. La loperamida es un opioide y un derivado sintético de la piperidina, indicado para el tratamiento de la diarrea aguda y crónica asociada a la enfermedad inflamatoria del intestino.

La mayoría de los problemas cardíacos graves reportados ocurrieron en individuos que realizaron un uso indebido o que abusaron de altas dosis de este medicamento. Los profesionales de la salud deben ser considerar el consumo de loperamida como una posible causa de inexplicables eventos cardíacos incluyendo fueron prolongación del intervalo QT, torsades points y otras arritmias ventriculares, síncope y paro cardíaco.

El riesgo además puede aumentar cuando se toman altas dosis con varios tipos de medicamentos que interactúan con loperamida entre los cuales se encuentran: cimetidina, ranitidina, ketoconazol, itraconazol, claritromicina, eritromicina, quinina, quinidina, tironavir, gemfibrozil.

Los pacientes deben consumir este medicamento según la indicación y dosis prescrita por los profesionales de la salud.

Disponible en:

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm504617.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

La Habana, 10 de junio 2016